

## Brustvergrößerung

*Vorgehen:* Verbessert Grösse und Form der Brust durch Implantation eines Silikon- oder mit Salzwassergefüllten Implantates. Dieses kann entweder über oder unter dem Brustmuskel placiert werden.

*Dauer des Eingriffs:* Die Operation dauert ca. 2 Stunden.

*Anästhesie:* Der Eingriff erfolgt entweder in Narkose oder in örtlicher Betäubung mit intravenöser Dämpfung.

*Ambulant/stationär:* Beides ist möglich, je nach Entscheidung der Patientin und des Arztes.

*Mögliche Begleiterscheinungen:* Milde vorübergehende Schmerzen, mässige Schwellung, vorübergehende Veränderung der Brustwarzensensibilität. Die Brust ist eventuell berührungsempfindlich während einigen Wochen.

*Risiken:* Die Implantate müssen unter Umständen entfernt oder ersetzt werden aus folgenden Gründen: Entleerung, Ruptur, Narbenbildung um das Implantat (Kapselkontraktur). Die Kapselkontraktur kann bewirken, dass sich die Brust straff und hart anfühlt. Blutung oder Infektion.

Andere Risiken umfassen: Erhöhung oder Verminderung der Brustwarzen und Brusthautsensibilität. In seltenen Fällen sind diese Sensibilitätsstörungen dauerhaft.

*Erholung:* Arbeitsfähigkeit innert wenigen Tagen. Körperkontakt mit der Brust (ausser Büstenhalter) sollte für 3-4 Wochen vermieden werden. Die Narben sollten zwischen drei Monaten und ca. 2 Jahren abflachen und verschwinden, je nach individueller Heilung.

*Resultate:* Das Resultat variiert von Patientin zu Patientin. Der Haupteffekt besteht darin, dass durch Vergrößerung der Brust diese vorteilhafter in Erscheinung tritt.