

Chirurgie des paupières

Intervention: Diminue l'affaissement et l'excès de peau de la paupière supérieure et les poches des paupières inférieures en enlevant l'excédant de graisse, de peau et de muscle.

Durée de l'intervention: Environ 2 heures.

Anesthésie: Anesthésie générale ou une sédation intraveineuse combinée avec une anesthésie locale.

Hospitalisation/Ambulatoire: Cette intervention est réalisée en ambulatoire.

Complications possibles: Inconfort temporaire, sensation d'étirement autour de l'œil, tuméfaction ou ecchymose. Un larmoiement excessif et une hypersensibilité à la lumière peuvent être présents durant les premières semaines. Une sécheresse temporaire, des brûlures, ou des démangeaisons de l'œil peuvent également survenir, mais ces effets secondaires sont rares.

Les suites: Le patient peut recommencer à lire après environ 2 à 3 jours et peut s'attendre à retourner au travail après approximativement 5 à 10 jours. L'utilisation des verres de contact peut reprendre après 2 semaines (dépendant de la réévaluation par un spécialiste). Le patient ne devrait pas consommer de l'alcool après l'intervention. Les efforts et la consommation d'alcool peuvent être repris après 3 semaines.

La tuméfaction et les hématomes devraient être partis après plusieurs semaines.

Les résultats: Pour certains, cette intervention va durer quelques années et pour d'autres elle est permanente.