

Cure de gynécomastie

Intervention: Réduction d'une poitrine élargie de type féminine chez l'homme, en utilisant la liposuction et/ou par excision chirurgicale de l'excès de tissu glandulaire.

Durée: Approximativement une heure et demie à trois heures.

Anesthésie: Une anesthésie générale peut être réalisée, ou une sédation intraveineuse avec complément d'anesthésie locale.

Hospitalier/Ambulatoire: Cette intervention se déroule en ambulatoire.

Effets indésirables possibles: Ecchymoses, œdèmes, insensibilité, douleurs ou sensation de brûlures temporaires.

Risques: Infection, sérome, lésions cutanées, plissement ou excès cutanés résiduels, asymétrie, altération de la pigmentation, cicatrices hypertrophiques, pertes de la sensation du mamelon, irrégularités du contour et dans certains cas la nécessité d'une nouvelle intervention pour compléter l'excision tissulaire.

Période postopératoire: Le patient peut reprendre son travail sept jours plus tard. Les activités plus intenses peuvent être reprises après deux à trois semaines. La majorité des œdèmes et ecchymoses se résorbent en trois à six mois.

Résultat: Permanent, bien qu'une prise pondérale ultérieure peut provoquer un nouvel élargissement de la poitrine.