

Mastopessi (lifting del seno)

Procedura: in questo intervento chirurgico viene rimossa la cute in eccesso a livello del seno. Si tratta di cute che si è estesa durante precedenti gravidanze o variazioni di peso corporeo. Per ottenere il risultato desiderato si utilizzano occasionalmente anche protesi mammarie.

Durata dell'intervento: circa 2-3 ore.

Anestesia: di regola viene utilizzata l'anestesia generale, ma l'intervento chirurgico può essere praticato anche in anestesia locale associata a sedazione endovenosa.

Ambulatoriale / con ricovero: sono possibili entrambe le opzioni, a seconda delle condizioni della paziente e delle preferenze del chirurgo.

Effetti collaterali: gonfiore transitorio e dolori e disturbi lievi della sensibilità. Secchezza e tensione della cute del seno.

Rischi: difetti di cicatrizzazione con formazione di cheloidi (raramente). Raramente perdita di cute, infezione, asimmetria dei capezzoli e possibilità di disturbi della sensibilità permanenti a livello di seno e capezzolo.

Fase di convalescenza: capacità lavorativa dopo 1-2 settimane; lavori intensi dopo un mese. La guarigione completa delle cicatrici può durare da diversi mesi a 1 anno.

Risultati: il risultato varia da paziente a paziente. Altri fattori in grado di influenzare il risultato sono la forza di gravità, la gravidanza e l'invecchiamento. Le variazioni del peso corporeo possono costituire un supplementare fattore in grado di favorire il seno cadente. I risultati possono eventualmente avere una durata maggiore in caso di contemporaneo impiego di protesi mammaria in grado di offrire un sostegno supplementare al seno rimodellato.