

Mastoplastica additiva

Procedura: migliora dimensioni e forma del seno mediante impianto di una protesi contenente silicone o soluzione salina. La protesi viene posizionata al di sopra o al di sotto del muscolo pettorale.

Durata dell'intervento: l'intervento chirurgico dura circa 2 ore.

Anestesia: l'intervento chirurgico viene eseguito in anestesia generale o in anestesia locale con sedazione endovenosa.

Ambulatoriale / con ricovero: sono possibili entrambe le opzioni, a seconda delle preferenze della paziente e del medico.

Possibili effetti collaterali: dolori lievi e transitori, gonfiore moderato, alterazione temporanea della sensibilità del capezzolo. Il seno può mostrare un'aumentata sensibilità al tatto per alcune settimane.

Rischi: è possibile che si renda necessario rimuovere o sostituire le protesi per i motivi seguenti: svuotamento, rottura o contrazione capsulare (formazione cicatriziale intorno all'impianto in seguito alla quale il seno può apparire teso e duro al tatto), emorragia o infezione.

Altri rischi comprendono: aumento o riduzione della sensibilità dei capezzoli e della cute del seno. In casi rari tali disturbi della sensibilità sono permanenti.

Convalescenza: abilità lavorativa entro pochi giorni. Per 3-4 settimane si dovrebbero evitare contatti fisici con il seno (ad eccezione del reggiseno). A seconda della velocità individuale di guarigione, le cicatrici dovrebbero attenuarsi e scomparire in un periodo variabile da 3 mesi a 2 anni.

Risultati: il risultato varia da paziente a paziente. L'effetto principale della mastoplastica additiva è la sottolineatura dell'aspetto estetico che si conferisce al seno.