

Resurfacing faciale au laser

Intervention: Ridules et rides sont gommées en utilisant le laser au dioxyde de carbone (CO₂, Erbium, ou un autre dispositif laser qui lissent plusieurs couches de peau endommagées. Cette intervention aide aussi à gommer les ridules autour de l'œil et de la bouche et minimiser les cicatrices faciales et les zones irrégulièrement pigmentées.

Durée: L'intervention prend environ une heure, dépendant des régions à traiter. Certains cas, nécessite plus d'une séance, 6 au maximum.

Anesthésie: Une anesthésie générale est pratiquée ou une anesthésie locale avec sédation intraveineuse.

Hospitalisation / Ambulatoire: Ceci est une intervention réalisée en ambulatoire.

Complications éventuelles: Tuméfaction temporaire de la zone resurfacée accompagnée d'un léger inconfort, une hypo- ou une hyperpigmentation de la zone traitée, une sensibilité exacerbée au soleil et/ou une sensibilité augmentée au maquillage ou aux produits de soins du visage. Une rougeur de la peau peut persister jusqu'à 6 mois.

Risque: Brûlures ou lésions causées par la chaleur du laser, cicatrice, changements anormaux de la coloration cutanée, éruption d'infections virales (bouton de fièvre) et rarement, autres infections.

Les suites: Le patient peut retourner au travail environ après 2 semaines. Les efforts peuvent reprendre après 4 à 6 semaines. Une disparition complète de la rougeur peut prendre jusqu'à 6 mois. Le patient devrait éviter l'exposition aux ultraviolets pendant 3 à 6 mois. L'utilisation d'écran total contenant une protection contre les UVA et UVB est très utile et est fortement recommandé.

Les résultats: De longue durée, mais cette intervention n'arrête pas le processus de vieillissement. Des nouvelles rides et des rides d'expression peuvent se reformer à mesure que la peau vieillit.