

Lifting

Intervention: Améliore l'affaissement de la peau faciale, des joues et de la peau du cou en enlevant l'excédant de graisse, en raffermissant les muscles et en retendant la peau.

Durée: Approximativement 4 heures.

Anesthésie: Habituellement l'anesthésie générale est utilisée ou le patient peut souhaiter avoir une anesthésie locale avec sédation.

Hospitalisation / Ambulatoire: Habituellement c'est une intervention ambulatoire, bien que certains patients peuvent nécessiter une courte hospitalisation.

Effets secondaires possibles: Hématome temporaire, tuméfaction, paresthésie et hypersensibilité de la peau, ainsi qu'un sentiment de tension et de sécheresse de la peau. Pour les hommes, nécessité d'un rasage permanent derrière les oreilles, où de la peau comportant de la barbe a été repositionnée.

Complications: Lésion des nerfs contrôlant les muscles faciaux ou la sensibilité (qui est le plus souvent temporaire), infection, saignement, mauvaise guérison, cicatrice hypertrophique, asymétrie et un changement de la ligne capillaire.

Les suites: Le patient peut retourner au travail après 10 à 14 jours. Les activités soutenues peuvent être reprises après 2 semaines ou plus. Les hématomes devraient commencer à disparaître après 7 à 10 jours. L'exposition au soleil doit être réduite pendant plusieurs mois après l'intervention. L'utilisation d'un écran total qui protège à la fois des UVA et UVB (ultraviolet) est recommandé.

Les résultats: La plupart des liftings gardent une apparence optimale pendant 5 à 10 ans.